

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE VDRL Y SU POSIBLE RELACIÓN CON NUEVOS CASOS DE SÍFILIS

Durand M J.; Espinosa Y.; Lorini L.

Abraham Laboratorios, España 1678. Mar del Plata. Argentina. C.P 7600. (0223) 4738814
 calidad@abrahamlaboratorios.com.ar

Introducción:

Sífilis, una enfermedad que parecía haber desaparecido, hoy es una problemática a nivel nacional. El incremento de casos registrados, sobretodo en jóvenes es debido al no uso del preservativo e inicio de relaciones sexuales a temprana edad. Según datos oficiales la tasa de casos se triplico entre 2013 y 2017

Objetivos:

Analizar los resultados de VDRL entre 2012 y 2018 y su relación con nuevos caso de sífilis.

Materiales y Métodos:

Se realizaron 18.891 VDRL. Los datos fueron clasificados según título, edad y sexo; diferenciando embarazadas y recién nacidos.

Resultados:

En la población estudiada en el año 2012 la prevalencia de VDRL reactivas fue del 1.29%, donde el 39% corresponde a mujeres, 34,1% hombres, 19,5% embarazadas y 7,30% recién nacidos.

En 2013 donde 55% fueron de mujeres y el 45% hombres. Prevalencia 1.48%

En 2014 con 48,8% de mujeres, 54,2% hombres 2,85% embarazadas. Prevalencia 1.22%

En 2015 con 30,7% de mujeres, 63,5% de hombres y 5,8% embarazadas. . Prevalencia 2.09%


En 2016 de las cuales 34,6% eran mujeres, 57,3% hombres y 8% embarazadas. Prevalencia 3.07%

En 2017 con 54,3% mujeres, 33,4% hombres y 12,4% embarazadas y 3.25%. Prevalencia 4.23%

En 2018 con 42,9% mujeres, 46,4% hombres y 10,7% embarazadas. . Prevalencia 3.25%

Solo un 20% fueron confirmados con FTA-ABS

Prevalencia de V.D.R.L en nuestra población de pacientes



Referencias

AÑO	Prevalencia
2012	1,29%
2013	1,48%
2014	1,22%
2015	2,09%
2016	3,07%
2017	4,23%
2018	3,25%

Conclusión

- 1) Hay un incremento de la prevalencia de casos de VDRL reactivas.
- 2) No hay diferencias significativas en la prevalencia por sexo, varía según el año.
- 3) Al informar un resultado de VDRL Reactiva sugerimos que se solicite su confirmación por FTA-ABS, no ocurre en la mayoría de los casos.
- 4) Para poder concluir que el aumento de prevalencia de VDRL reactivas corresponde a nuevos casos de sífilis, se deberían tener las pruebas confirmatorias requeridas.